UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

FACTORES QUE PREDISPONEN A LA MORTALIDAD MATERNA EN EL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA, 2016.

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADAS EN ENFERMERÍA

BACH. ENF. FRANCY PENNY CHÁVEZ GUTIÉRREZ

BACH. ENF. ZAIDA TUESTA MACUYAMA

ASESORA: ISABEL ESTEBAN ROBLADILLO

PUCALLPA – PERÚ

2017

Esta tesis fue aprobada por el jurado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Ucayali

Dra. AURISTELA CHÁVEZ VIDALÓN

Presidenta

Dra. JUDITH M. MAYMA ALVARADO

Miembro

Dr. CESAR E. LLAJA ROJAS

Miembro

DEDICATORIA

A Dios por darme la vida y salud para lograr mis metas.

A mis padres que siempre me inculcan valores para ser una mejor persona.

Francy P. Chávez.

A Dios por la vida que me da. A mis padres, por el apoyo incondicional para alcanzar mis objetivos y metas.

Zaida Tuesta.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad nacional de Ucayali, por la oportunidad de formarnos como excelentes profesionales.

A la facultad de Ciencias de la Salud, por el apoyo brindado en estos años de formación.

A nuestros docentes de la Escuela Académico Profesional de Enfermería, que, con su experiencia laboral, permitieron nuestro desarrollo profesional.

Al Jefe de registros del Hospital de Yarinacocha, por las facilidades brindadas para la ejecución del trabajo de investigación.

A todas las personas que de una u otra manera colaboraron y apoyaron desinteresadamente la realización de la investigación.

ÍNDICE DE CONTENIDO

Pág.

DEDICATORIA iii

AGRADECIMIENTO iv

RESUMEN viii

ABSTRAC ix

INTRODUCCIÓN x

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Formulación del problema 13

1.2 justificación 16

1.3 Objetivos de la Investigación 17

1.4 Objetivo General 17

1.5 Objetivos Específicos..... 17

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del Problema 18

2.1.1 Nivel internacional 18

2.1.2 Nivel nacional..... 20

2.1.3 Nivel Local..... 22

2.2 Planteamiento Teórico del Problema 23

2.2.1 Mortalidad materna 23

2.2.2 Factores que predisponen a la mortalidad materna 33

2.3 Definición de Términos Básicos..... 35

2.4 Variables y Operacionalización de variables 37

2.4.1 Variables 37

2.4.2 Operacionalización de variables 38

CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Método de investigación 39

3.2 Población y Muestra 39

3.3 Procedimientos de recolección de datos 40

3.4 Técnica e instrumentos para la recolección de datos..... 40

3.5 Tratamiento de datos..... 41

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados y discusión 43

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones 51

5.2 Recomendaciones 52

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Factor económico que predispone la mortalidad materna en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2016..... 43

Tabla 2. Factor patológico que predispone a la mortalidad materna en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2016..... 44

Tabla 3. Factor cultural que predispone a la mortalidad materna en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2016..... 48

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo general determinar los factores económicos, patológicos y culturales que predisponen a la mortalidad materna en pacientes del Hospital Amazónico de Yarinacocha; se utilizó un estudio descriptivo, analizando la historia clínica de las mujeres gestantes que fallecieron en el Hospital Amazónico de Yarinacocha. Se empleó una ficha de registro para la recolección de datos. Resultados: De 15 casos evaluados, un 73.4% fueron amas de casa, el 100% de las madres fallecidas no presentó cesárea, el 40% ninguna gestación, el 20% tuvo de 3 a más gestaciones, el 66.7% ningún aborto, el 33.3% solo un aborto anterior, el 26.7% presentó eclampsia, el 66.7% no presentó complicación durante el parto, el 20% falleció de PCR, el 40% no presentó complicación después del parto, el 26.6% y el 6.6% falleció de Hemorragia y Shock HV respectivamente, el 73.4% no presentó antecedente personal, el 86.7% no presentó antecedente familiar, un 40% presentó menos de 6 controles prenatales, el 60 % no recibió vacuna durante la gestación y solo el 33.3 % se aplicó la vacuna influenza, un 100 % no se realizaron el examen de PAP, un 93.3% se atendieron en parto hospitalario y un 6.7% fueron domiciliario, el 86.6% no pertenecía a un grupo étnico, pero solo un 6.7% fueron shipibos y ashaninkas, conclusiones: Los factores patológicos que representan una mayor predisposición a la mortalidad materna son la eclampsia y hemorragias obstétricas.

Palabras clave: factores económicos, patológicos y culturales.

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the economic factors, pathological and cultural factors related to maternal death in patients of Amazonico de Yarinacocha Hospital; the design was a descriptive study, by reviewing clinical history of women that died in the hospital mentioned, by using a validated sheet to collect the data. Results: Among 15 cases, 13.4% were housewives, no one had cessareum, 40% were in the first pregnancy, 20% had 3 or more pregnancies, 66.7% did not have a miscarriage, 33.3% a previous misscarriage, 26.7% hada eclampsia, 66.7% did not have any complication during the delivery, 20% of the death were of PCR, 20% did not have any complication, 26.6% and 6.6% died of hemorragy and hypovolemic shock respectively. 73.4% did no have any patological family history, 40% had less than 6 prenatal controls, 60% did no have any vaccinate, and only to the 33.3% tha influenza vaccine was applicated, 100% did no have any PAP study, 93.3% were atended in the hospital, and 6.7% at home. 86.6% were not related to any ethnic group, and 6.7% were from shipibos and/ or ashaninkas. Conclutions: Pathological factors that represent a greater predisposition to maternal mortality are eclampsia and obstetric haemorrhages

Key words: economic factors, pathological factors and cultural factors.

INTRODUCCIÓN

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Para finales de 2015 habrán muerto unas 303 000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas muertes se producen en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. La mejora de la salud materna era uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. Con respecto al ODM, los países se comprometieron a reducir la mortalidad materna en un 75% entre 1990 y 2015. Desde 1990, el número de muertes maternas ha disminuido en un 43%. Desde 1990 varios países sub Saharianos han reducido a la mitad su mortalidad materna. En otras regiones, como Asia y el Norte de África, los progresos han sido aún mayores. Entre 1990 y 2015, la RMM mundial (es decir, el número de muertes maternas por 100 000 nacidos vivos) solo se redujo en un 2,3% al año. Sin embargo, a partir de 2000 se observó una aceleración de esa reducción. En algunos países, las reducciones anuales de la mortalidad materna entre 2000 y 2010 superaron el 5,5% necesario para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. Al ver que es posible acelerar la reducción, los países han adoptado una nueva meta para reducir aún más la mortalidad materna. Una de las metas del objetivo de desarrollo Sostenible 3 consiste en reducir la RMM mundial a menos de 70 por 100 000 nacidos vivos y lograr que ningún país tenga una mortalidad materna que supere el doble de la media mundial. El alto

número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos y pobres. La casi totalidad (99%) de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo: más de la mitad al África subsahariana y casi un tercio a Asia Meridional. Más de la mitad de las muertes maternas se producen en entornos frágiles y contextos de crisis humanitaria (1)

De este conjunto de fundamentos teóricos nace la importancia de realizar la investigación planteándonos el siguiente problema ¿Cuáles son los factores que predisponen a la mortalidad materna en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2016?, el objetivo general fue determinar los factores que predisponen a la mortalidad materna en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2016, así mismo se formularon los siguientes objetivos específicos:

- Identificar los factores económicos que predisponen a la mortalidad materna en pacientes del Hospital Amazónico de Yarinacocha.
- Indicar los factores patológicos que predisponen a la mortalidad materna en pacientes del Hospital Amazónico de Yarinacocha.
- Describir los factores culturales que predisponen a la mortalidad materna en pacientes del Hospital Amazónico de Yarinacocha.

El estudio de investigación consta de cinco capítulos.

Primer capítulo: Planteamiento del problema de investigación, justificación y objetivos de la investigación.

Segundo capítulo: Marco teórico, términos básicos, variables y operacionalización de variables.

Tercer capítulo: Metodología, población, muestra y procesamiento de recolección de datos.

Cuarto capítulo: Resultados y discusión.

Quinto capítulo: Conclusiones y recomendaciones.