UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL
04/04/17
OFICINA EJECUTIVA DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

TESIS

"COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS RELACIONADAS AL EMBARAZO ADOLESCENTE REGISTRADAS EN EL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA EN EL PERÍODO JULIO- DICIEMBRE 2016".

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

PRESENTADO POR LA BACHILLER:

CINDY BETH TEJADA QUILICHE

PUCALLPA – PERÚ
2017

RESUMEN

Introducción: El embarazo en la adolescente se asocia a un mayor riesgo de complicaciones durante la gestación como Preeclampsia, infecciones, anemia, hemorragia postparto, ruptura prematura de membranas entre otras. Además es frecuente la indicación de cesárea y de esta manera aumentan también las complicaciones post parto y por lo tanto deriva a un problema importante en la salud pública resultando a un mayor gasto económico del gobierno y depleción de la salud materna. Esto hace que se convierta en una preocupación tanto desde el punto de vista social como médico.

Objetivo: Determinar la relación entre las complicaciones obstétricas y embarazo adolescente registradas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha en el período julio-diciembre 2016.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio no experimental, cuantitativo de tipo correlacional, transversal, analítico de tipo casos y controles en 1835 madres, tomando según fórmula de muestreo una muestra de 62 madres adolescente y 124 madres no adolescentes; de las .cuales se escogió un muestreo sistemático con un intervalo de selección de 5. Se aplicó la ficha de recolección de datos conformada por 3 dimensiones: Datos generales, datos obstétricos y complicaciones obstétricas. Se realizó estadística descriptiva usando variables cualitativas y porcentajes. Se utilizó estadística inferencial utilizando para cruce de variables cualitativas la prueba de Chi Cuadrado.

Resultados: La edad de las pacientes comprendió un rango mínimo de 10 años y máximo de 19 años. La principal complicación obstétrica presentada fue la infección del tracto urinario (OR: 4,191, IC95% 2,156-8,178; p: 0,000). Seguido de la variable anemia en gestantes (OR 4,062), desproporción cefalopélvica (OR 2,736), culminación del Parto vía cesárea (OR 2,287), Desgarro Perineal (OR 1,976).Asimismo, se encontró relación no significativa estadísticamente para las variables Preeclampsia, periodo expulsivo prolongado, placenta previa, Hemorragia post parto, ruptura prematura de membranas y mortalidad materna con un valor del $p>0.05$.

Conclusión: Se encontró que las complicaciones obstétricas que se relacionan con el embarazo adolescente, registradas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha en el período julio- diciembre 2016, fueron la infección de tracto urinario, la anemia en gestantes, la culminación de parto vía cesárea, la desproporción cefalopélvica, y el desgarro perineal.

Palabras Clave: madre, embarazo adolescente, Preeclampsia, infección de tracto urinario, cesárea, placenta previa, ruptura prematura de membranas, anemia, desgarro perineal.

ABSTRACT

Introduction: Adolescent pregnancy is associated with an increased risk of complications during pregnancy such as preeclampsia, infections, anemia, postpartum haemorrhage, premature rupture of membranes among others. In addition, the indication of the shell is frequent and in this way also complicates the delivery of childbirth and consequently an important problem in the public health derived from a mayor economic government expenditure and depletion of maternal health. This makes it a concern both socially and physically.

Objective: To determine the relationship between obstetric complications and adolescent pregnancy in the Hospital Amazónico de Yarinacocha in the period July-December 2016.

Materials and Methods: A non-experimental, quantitative, correlational, cross-sectional, case-control and analytical type study was carried out in 1835 mothers, using as sampling formula a sample of 62 adolescent mothers and 124 non-adolescent mothers; From which a systematic sampling was chosen with a selection interval of 5. It is applied to the data collection sheet conformed by 3 dimensions:
General data, obstetric data and obstetric complications. Descriptive statistics were performed using qualitative variables and percentages. Inferential statistics were used for the crossing of qualitative variables the Chi Square test.

Results: The age of people comprised a minimum of 10 years and a maximum of 19 years. The main obstetric complication presented was urinary tract infection (OR: 4,191; 95% CI: 2,156-8,178; p: 0,000). Followed by the variable anemia in pregnant women (OR 4.062), cephalopelvic disproportion (OR 2,736), culmination of Cesarean Delivery (OR 2,287), Perineum Tear (OR 1976). In addition, we found the relationship without statistical statistics for the variables Preeclampsia, prolonged expulsive period, placenta previous, postpartum haemorrhage and premature rupture of membranes and maternal mortality with a value of $p > 0.05$.

Conclusion: Obstetric complications associated with adolescent pregnancy, recorded at the Hospital Amazónico de Yarinacocha in the period July-December 2016, were found to be urinary tract infection, anemia in pregnant women, completion of delivery via caesarean section, the cephalopelvic disproportion, and the perineum tear.

Key words: mother, adolescent pregnancy, preeclampsia, urinary tract infection, cesarean section, placenta previous, premature rupture of membranes, anemia, perineum tear.