UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"FACTORES QUE DIFICULTAN LA TOMA DEL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN MUJERES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA MELITA RUIZ DE PADILLA PUCALLPA- REGION UCAYALI 2016"

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESSIONAL DE:

LICENCIADO EN ENFERMERÍA

AUTORES:

Bach. Enf. Norka Fiorella Rivera Romero.

Bach. Enf. Delia Ruth Rodriguez Pezo.

PUCALLPA – PERÚ

2016

RESUMEN

Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar los factores que dificultan la toma del examen de Papanicolaou en mujeres de la Asociación Pro-vivienda Melita Ruiz de Padilla Pucallpa-región Ucayali-2016; Se utilizó el método descriptivo, de tipo transversal, no experimental; Se aplicó un cuestionario dividido en 4 secciones, validados por juicios de expertos. La población estuvo constituida por 350 mujeres y la muestra con 120 mujeres entre 15 a 45 años. Resultados: 68% bajo nivel de conocimiento, 26% conocimiento medio, 6% conocimiento alto, 70% tienen grado de instrucción primaria, 27% secundaria, 3% sin instrucción, 65% miedo al dolor y vergüenza, 63% miedo al dolor y temor a los resultados, 49% desidia, 79% son de ocupación ama de casa, 10% independientes, 7% empleados público, 4% estudiantes, 57% convivientes, 28% casadas, 15% solteras, 68% tiempo de espera en el establecimiento de salud es prolongado, 29% mala atención y 3% porque el medico es hombre. Conclusiones: los factores que dificultan la toma del examen de Papanicolaou en las mujeres son los factores culturales con el bajo nivel de conocimiento, miedo al dolor y vergüenza al procedimiento y factores funcionales como el tiempo de espera en el establecimiento de salud es prolongado.

Palabras clave: Factores, Papanicolaou, Cáncer de cérvix.

ABSTRACT

this research is carried out with the objective of determine themfactors that hinder the takes of the examination of PAP in women of the Association Pro-vivienda Melita Ruiz of Padilla Pucallpa-region Ucayali-2016; The descriptive method of transverse, non-experimental type; Applied a questionnaire divided into 4 sections, validated by expert opinions. The population was constituted by 350 women and it shows with 120 women between 15 to 45 years. Results: 68% low level of knowledge, 26% average knowledge, 6% high knowledge, 70% have elementary education degree, 27% secondary, 3% without instruction, 65% fear of pain and shame, 63% fear of pain and fear of the results, 49% neglect, 79% are occupation housewife, 10% independent, 7% public employees, 4% students, 57% living together, 28% married, 15% single, 68% waiting time in the health facility is extended 29% poor care and 3% because the doctor is a man. Conclusions: the factors that hinder the taking of the Pap test in women are cultural factors with the low level of knowledge, fear of pain and shame to the procedure and functional factors as timeout in the health facility is extended.

Key words: factors, Pap smear, Cervical Cancer.