UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA

05/09/16
BIBLIOTECA CENTRAL
U N U

"CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA, Y USO TRADICIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO UCAYALI, DISTRITO DE IPARIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI, 2014"

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO AGRÓNOMO

KEENNY PACAYA SIMA

PUCALLPA - PERÚ
2016

"Caracterización Ecológica, y Uso Tradicional de los Recursos Naturales en la Cuenca Media del Rio Ucayali, Distrito de Iparia, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, 2014"

Pacaya Sima Keenny.

RESUMEN.

Se realizó el estudio de investigación que muestra el aprovechamiento y uso de los recursos vegetales en los caseríos Santa Cecilia de Nuevo Pacache, Cunchuri y la Comunidad Nativa Vista Alegre de Iparia, ubicadas en el Distrito de Iparia, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali. La investigación tiene un enfoque principalmente a los jefes de familias, donde se evaluó los diferentes conocimientos sobre el uso de las especies vegetales, considerando el 80% informantes hombres y 20% mujeres, todas dirigidas a jefes de hogares de 4 rangos de edades, se realizó 60 encuestas semi-estructuradas y recorridos por todo el pueblo y bosque con los informantes locales, el área de aprovechamiento y la colecta de los recursos vegetales fueron reconocidas por la población por el nombre que comúnmente son conocidas. En total se registraron 34 especies de mayor uso tradicional por hombres y mujeres Shipibos-Conibos y Mestizos. Las especies más importantes según la frecuencia de uso en las mujeres se reportó: *Heteropsis linearis, Cyperus papirus, Iriarthea exorrhiza, Ewietenia macrophylla.* En caso de los hombres las especies más importantes son: *Iriarthea exorrhiza, Attalea phalerata, Phytelephas macrocarpa, Oxandra acuminata, Bactris gasipae.* Las diferencias en el uso de especies vegetales en estos lugares se deben a las distintas actividades por género que realizan la población y la adquisición de conocimientos y usos están influenciado por la edad y el género. Se aprovecha especies maderables para ser comercializada principalmente, y las especies no maderables son usadas solo para usos locales. En la abundancia de los recursos vegetales reconocidos por la población fue, más poco 73% e igual 27%, en la cual se percibe que ha disminuido en comparación con 10 años atrás, debido a los usos intensos de los recursos vegetales. En el reconocimiento de la percepción y frecuencia de especies de fauna silvestres reconocidas por la población informante fue, el 88% aves y 12% animales silvestres, las cuales son observadas en las actividades que realizan la

población, indicando que son las aves con mayor frecuencia en comparación de años anteriores donde se podía percibir varias especies tanto de animales, aves y otros. Por otra parte, los pobladores perciben estos cambios de manera negativa.

"Ecological caracterization, and Traditional use of Natural Resources in the Ucayali River basin, Iparia District, Coronel Portillo Province, Ucayali region, 2014."

Pacaya Sima Keenny.

SUMMARY.

This research shows the exploitation and use of plant resources in the Santa Cecilia de Nuevo Pache, Cunchuri and Vista Alegre Villages of Iparia District, Coronel Portillo Province, and Ucayali Region. This study focuses mainly in heads of families, where the different knowledge about the use of plant species was evaluated, considering that 80% of informants were men and 20 % were women respectively, and every woman was involved to heads of families of four ranges of age. Furthermore sixty semi-structured interviews were realized, walking with the local informants through to the whole village and forest. The exploitation area and the collection of plant material were recognized by the local people for its common names. Thirty four species of major traditional use were registered by shipibo-conibo and mestizo men and women. The most important species according to the use frequency by women were: *Heteropsis linearis, Cyperus papyrus, Iriarthea exorrhiza, Ewietenia macrophylla*. On the other side in the case of men were: *Iriarthea exorrhiza*, *Attalea phalerata, Phytelephas macrocarpa, Oxandra acuminate, Bactris gasipae*. The different use of plant species in these places is related to the distinct activities that the population realizes and the acquisition of knowledge and uses that are influenced by age and gender. Finally wood species are utilized only by local people. The frequency and perception of plant species and wildlife is much less in comparison with the past years due the extension of shifting cultivation, livestock and wood extraction. .In the abundance of plant resources recognized by the population it was more like little 73% and 27%, which is perceived to have decreased compared with 10 years ago, due to the intense use of plant resources. In recognition of perception and frequency of fauna species recognized by the reporting population was 88% poultry and 12% wild animals, which are observed in their activities, indicating that the birds are the most often compared to previous years where they could see several species of both

animals, birds and others. Moreover, villagers perceive these changes negatively.