UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL
06/03/17
OFICINA EJECUTIVA DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

"CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y POSTQUIRURGICAS DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL II ESSALUD – PUCALLPA EN EL 2015."

TESIS

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE MEDICO CIRUJANO

PRESENTADO POR LA BACHILLER:

RENGIFO MELÉNDEZ, ROCIO ISABEL

PUCALLPA – PERU

2016

RESUMEN

Introducción: La apendicitis aguda continúa siendo la afección quirúrgica cuyo diagnóstico se plantea más frecuente en los servicios de urgencia de un hospital y ocupa una buena parte de las intervenciones practicadas. **Objetivo:** Describir las características clínicas, epidemiológicas y postquirúrgicas de apendicitis aguda en pacientes atendidos en el Hospital II Essalud – Pucallpa en el 2015. **Metodología:** estudio descriptivo retrospectivo con datos del sistema de gestión hospitalaria y del Archivo de historias clínicas del Hospital II Essalud Pucallpa. Se consideró un Universo Muestral de 212 víctimas y se utilizó una ficha de recolección de datos para la obtención de los mismos. **Resultados:** Se observó que el 57% de los casos fueron varones y el 43% mujeres, 26% de los pacientes tenían más de 41 años, el 98% fueron operados por laparoscopia, el 60% inicio la dieta enteral a las 12 horas desde el post-operatorio, el 47% fue dado de alta a las 36 horas desde el ingreso, el dolor en la fosa iliaca derecha se presentó en un 95% de los pacientes. **Conclusiones:** La mayor de pacientes fueron varones, la mayoría de pacientes tenían más de 41 años, la mayor fueron operados por laparoscopia, la mayoría fue dado de alta a las 36 horas, el dolor en fosa iliaca derecha fue el que más se presentó en los pacientes. **Recomendaciones:** se recomienda el uso de la cirugía laparoscópica como técnica quirúrgica estándar para apendicitis aguda independientemente del tiempo de enfermedad.

Palabras clave: apendicitis aguda, laparoscopia, cirugía, estancia hospitalaria.

ABSTRACT

Introduction: Acute appendicitis remains the surgical condition whose diagnosis is considered more common in the emergency services of a hospital and occupies a large part of the procedures performed. **Objective:** To describe the epidemiological clinical characteristics, and postoperative acute appendicitis in patients treated at the Hospital II Essalud - Pucallpa in 2015. **Methodology:** retrospective study with data from hospital management system and patient record Hospital II Essalud Pucallpa. Sampling a universe of 212 victims and was considered a form of data collection was used to obtain them. **Results:** It was observed that 57% of the cases were male and 43% female, 26% of patients had more than 41 years, 98% were operated by laparoscopy, 60% start enteral diet at 12 hours postoperative, 47% were discharged within 36 hours from admission, pain in the right iliac fossa was presented in 95% of patients. **Conclusions:** The majority of patients were male, most patients were over 41 years, most were operated by laparoscopy, most were discharged at 36 hours, pain in the right iliac fossa was the most presented in the patients. **Recommendations:** the use of laparoscopic surgery as the standard surgical technique for acute appendicitis is recommended regardless of the time of illness. **Keywords:** acute appendicitis, laparoscopy, surgery, hospital stay.