

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA PREVALENCIA DE ITS-
VIH/SIDA EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LOS HOSPITALES DE
PUCALLPA Y YARINACocha 2011.

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN
ENFERMERIA

Presentado por:

Bach. Enf. Paredes Ponte, Liliana Flor.

Bach. Enf. Rodríguez Oré, Yuliana Pilar.

Bach. Enf. Rojas Daza, Joe Dabny.

PUCALLPA – PERÚ

2011

RESUMEN

El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar los factores de riesgo: personales, biológicos, culturales y sociales que influyen en la prevalencia de ITS-VIH/SIDA en adolescentes que acuden a los hospitales de Pucallpa y Yarinacocha 2011. De diseño no experimental, corte transversal, descriptivo, correlacional y comparativo.

La muestra estuvo conformada por 100 adolescentes del hospital Regional de Pucallpa y 100 adolescentes del hospital Amazónico de Yarinacocha que acudieron a los servicios externos de Medicina, Gineco-Obstetricia, PROCITTS y CEDITSS, en el mes de febrero.

Se llegó a las siguientes conclusiones: Con respecto a la Prevalencia en el hospital Amazónico de Yarinacocha se encontró 48 casos de ITS predominando la vaginitis con 21 casos, seguido de la gonorrea con 15 casos, así mismo 8 casos de tricomoniasis, 3 casos sífilis y solo un caso de herpes genital todos ellos son varones. Al comparar con el hospital Regional de Pucallpa se encontraron 44 casos de ITS, predominando la vaginitis con 20 casos, seguido de la gonorrea con 12 casos y 12 casos de tricomoniasis.

Respecto al factor personal en ambos hospitales la mayoría de los adolescentes hacen un uso inadecuado de su tiempo libre y la opción que tuvo mayor porcentaje es salir a bailar con sus amigos los fines de semana en su mayoría son mujeres procedentes de zona urbano marginal, con grado de instrucción secundaria incompleta.

Respecto a los factores culturales en el hospital de Pucallpa el 74% de adolescentes tuvieron un conocimiento insuficiente, seguido del 22% de adolescentes que poseen un conocimiento regular y solo 2 de cada 50 adolescentes tienen un buen conocimiento. Al comparar con el hospital Amazónico de Yarinacocha el 74% de adolescentes tuvieron un conocimiento

insuficiente, seguido del 20% que poseen un conocimiento regular y solo 3 de cada 50 adolescentes poseen un buen conocimiento.

En los factores sociales destaca las practicas sexuales donde el hospital Regional de Pucallpa el 53% de los adolescentes iniciaron su primera relación sexual entre 10-14 años con una edad promedio de 14 años, con mayor predominio en el sexo femenino. Así mismo 02 adolescentes varones refieren haber iniciado su primera relación sexual a los 8 años. Al comparar con el hospital Amazónico de Yarinacocha el 56% de los adolescentes iniciaron su primera relación sexual entre 15-19 años con una edad promedio de 15 años, con mayor predominio en el sexo femenino. Así mismo 01 adolescente varón refiere haber iniciado su primera relación sexual a los 8 años.

Por otro lado en el hospital Regional de Pucallpa el 52% de los adolescentes manifestaron practicar los tres tipos de relaciones sexuales (vaginal, anal y oral), así mismo el 15% prefieren practicar como única opción el sexo vaginal y en su mayoría son mujeres. Al comparar con el hospital Amazónico de Yarinacocha el 61% de adolescentes manifestaron practicar los tres tipos de relaciones sexuales (vaginal, anal y oral), así mismo el 9 % prefieren practicar como única opción el sexo vaginal en su mayoría son mujeres.

Palabras claves: Infecciones de transmisión sexual, etapas de la adolescencia, factores de riesgo y prevalencia.

ABSTRACT

The present work was realized by the aim to determine the factors of risk: personal, biological, cultural and social that influence ITS-VIH/SIDA's prevalencia teenagers who come to the hospitals of Pucallpa and Yarinacocha 2011. Of design is not experimental, transverse court, descriptive, correlacional and comparatively.

The sample is shaped by 100 teenagers of the Regional hospital of Pucallpa and of Yarinacocha's Amazonian hospital who come to the external services of Medicine, Gineco-obstetrics, PROCITTS and CEDITSS, in February.

The technology of the survey was in use and since I orchestrate the Questionnaire. The compiled information was processed by means of the computer science, the analysis of information I base in the descriptive statistics and in the contrastación of the hypotheses I use the statistics not paramétrica of the chi squared with a level of significancia of 0,05.

It came near to the following conclusions: With regard to the Prevalencia in Yarinacocha's Amazonian hospital one found 48 ITS's cases predominating over the vaginitis with 21casos, followed by the gonorrhoea with 15 cases, likewise 8 cases of tricomoniasis, 3 cases syphilis and only a case of genital herpes and these are males. On having compared with Pucallpa's Regional hospital they found 44 ITS cases predominating over the vaginitis with 20 cases, followed by the gonorrhoea with 12 cases and 12 of tricomoniasis.

The personal factor in Pucallpa's Regional hospital and in Yarinacocha's Amazonian hospital the majority of the teenagers do an inadequate use of his free time, between the option with major percentage it is to go out to dance with his friends of week followed of not reading a book in his free time and in the main they are women proceeding from zone urban marginally, with degree of secondary incomplete instruction.

With regard to the cultural factors the level of knowledge reached in Pucallpa's hospital 74 % of teenagers had an insufficient knowledge, followed by 22 % of teenagers who possess a regular and alone knowledge 2 of every 50 teenagers have a good knowledge.

On having compared with Yarinacocha's Amazonian hospital 74 % of teenagers they had an insufficient knowledge, followed by 20 % that possess a regular and alone knowledge 3 of every 50 teenagers possess a good knowledge.

With regard to the social factors we find the sexual practices where Pucallpa's Regional hospital 53 % of the teenagers initiated his first sexual relation between 10-14 years with an average age of 14 years, with major predominance in the feminine sex. Likewise 02 teen males recount to have initiated his first sexual relation at the age of 8. On having compared with Yarinacocha's Amazonian hospital 56 % of the teenagers they initiated his first sexual relation between 15-19 years with an average age of 15 years, with major predominance in the feminine sex. Likewise 01 teen male recounts to have initiated his first sexual relation at the age of 8.

On the other hand in Pucallpa's Regional hospital 52 % of the teenagers demonstrated to practise three types of sexual relations (vaginal, anal and oral) and they are single, likewise 15 % prefers practising as the only option the vaginal sex and in the main they are women. Having compared with Yarinacocha's Amazonian hospital 61 % of teenagers in the main are women they indicated to practise three types of sexual relations (vaginal, anal and oral) and in a minor percentage the males, likewise 9 % prefers practising as the only option the vaginal sex in the main they are women.

Key words: Infections of sexual transmission, stages of the adolescence, factors of risk and prevalencia.