# UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

## ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

# "FACTORES DE RIESGO MAS FRECUENTES DE LA PREECLAMPSIA EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA EN LOS AÑOS DEL 2012 AL 2015"

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

LICENCIADO EN ENFERMERÍA


AUTORES:

BACH. ENF. CARTAGENA PINEDO JESSY JUNETH

BACH. ENF. JAIME RUIZ JOHAN FARETTY

ASESORA:

LIC. ENF. YNÉS DEL CARMEN TAVERA ARÉVALO



PUCALLPA – PERÚ

2017

## RESUMEN

En esta investigación el objetivo general fue identificar los factores de riesgo más frecuentes de la preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa en los años del 2012 al 2015. Material y método: El estudio corresponde a un enfoque cuantitativo de diseño no experimental, de tipo descriptivo retrospectivo, la población estuvo constituida por 436 historias clínicas gineco-obstétricas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia y la muestra de 400 historias clínicas que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó una ficha de cotejo dividido en cinco partes donde se tuvo en cuenta el factor preconcepcional y concepcional, los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 22. Resultados: El 100% de gestantes presentaron factor de riesgo preconcepcional y el 72% factor de riesgo concepcional. Dentro de los factores de riesgo preconcepcionales sobresale con 62% las multigestas, con 43% los antecedentes familiares de preeclampsia y el 34% la edad ≤ de 20 años; en los factores de riesgo concepcionales destaca con 49% el control prenatal deficiente y con 45% las infecciones urinarias. Conclusión: Entre los factores de riesgo para la preeclampsia en las gestantes destacan los factores preconcepcionales que mayormente se encuentran presentes en todas las gestantes, ya que los riesgos más predominantes a desarrollar preeclampsia se da antes de la gestación y no durante ella.



**Palabras clave:** Riesgo preconcepcional, Riesgo concepcional.

## ABSTRACT

In this investigation, the general objective was to identify the most frequent risk factors of preeclampsia in pregnant women attended at the Regional Hospital of Pucallpa in the years of 2012 to 2015. Material and method: The study corresponds to a quantitative approach of non-experimental design, Of the retrospective descriptive type, the population consisted of 436 gynecological-obstetric clinical histories of pregnant women with a diagnosis of preeclampsia and the sample of 400 clinical histories that met the inclusion and exclusion criteria. A five-part collating chart was used, where the preconception and conception factor was taken into account. Data were processed using the statistical program SPSS version 22. Results: 100% of pregnant women presented preconception risk factor and 72% of conceptional risk factor. Among the preconceptional risk factors, 62% presented multigestage, with 43% having a family history of preeclampsia and 34% with age ≤ 20 years; In conceptional risk factors, 49% showed poor prenatal control and 45% had urinary tract infections. Conclusion: Among the risk factors for preeclampsia in pregnant women, the preconceptional factors that are mostly present in all pregnant women are highlighted, since the most predominant risks to preeclampsia are pre-gestation and not during pregnancy.



**Key words:** Risk Preconception, risk conceptional.