UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL
04/04/17
OFICINA EJECUTIVA DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

TESIS

PERCEPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS EN USUARIOS DE CONSULTORIO EXTERNO DEL HOSPITAL II ESSALUD-PUCALLPA-2016.

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

PRESENTADO POR EL BACHILLER:

NATALY FIORELLA GUEVARA SALIRROSAS

PUCALLPA, MARZO DEL 2017

RESUMEN

Objetivo: Determinar las percepciones y características demográficas más comunes sobre la automedicación con antibióticos en los usuarios de consultorio externo atendidos en el Hospital II ESSALUD de Pucallpa en el año 2016.

Materiales y métodos: Estudio tipo encuesta, Cuali - Cuantitativo, descriptivo y transversal.

Población: Usuarios de consultorios Externos del Hospital II Essalud – Pucallpa.

Muestra: 396 pacientes.

Los datos fueron analizados por el programa SPSS con lo cual se elaboró tablas y cruces de variables.

Resultados: El 39,9% de los usuarios se automedican con antibióticos. Los que se automedican con antibióticos el 43,36% cuentan con educación superior; se demostró que existe relación entre los usuarios con educación superior y automedicación con antibióticos; el 40,2% son del género femenino; los de 36 a 45 años son lo que más se automedican en un 48,62%; los antibióticos más usados en la automedicación son los betalactámicos (51,9%), en mayor proporción la amoxicilina; el 66,5% lo usaron menos de 5 días; el modo de acceso fue por petición directa del usuario en un 44,94% y por recomendación del Farmacéutico en un 37,9%; la principal vía de administración de la automedicación fue la vía oral en 95,6%. Los síntomas respiratorios fueron la causa más común de automedicación y los motivos más frecuentes no relacionados a la salud para automedicarse fue el "tiempo de espera prolongado", "terapia ya conocida", "tenía antibióticos en casa".

Conclusiones: El 39,9% de los usuarios de consultorio externo del Hospital II – EsSalud – Pucallpa practica la automedicación con antibióticos; existiendo relación entre quienes tienen educación superior y la automedicación; siendo probablemente las infecciones respiratorias la causa más común, sin embargo se describen otras causas como "tiempo de espera prolongado", "terapia ya conocida", "tenía antibióticos en casa" como posibles

causas de automedicación. Los grupos de antibióticos con cuales se automedican fueron los betalactámicos; el principal modo de acceso a los antibióticos fue por petición directa del usuario; la principal vía de administración fue la Oral, el tiempo de uso en su mayor porcentaje fue menos de 5 días.

PALABRAS CLAVES: Automedicación, Antibiótico, Usuario.

ABSTRACT

Objective: To determinate the most common perceptions and demographic characteristics of self - medication with antibiotics in outpatient users treated at Hospital II ESSALUD in Pucallpa in 2016.

Materials and methods: Survey-type, Cuali - quantitative, descriptive and cross-sectional study.

Population: users of external clinics of Hospital II Essalud - Pucallpa.

Sample: 396 patients.

The data were analyzed by the program SPSS 23 with which it was elaborated tables and crossings of variables.

Results: 39.9% of users did self-medicate with antibiotics; Those who self-medicate with antibiotics 43.36% have higher education; It was demonstrated that there is a relationship between users with higher education and self-medication with antibiotics; 40.2% are female; The ages 36 to 45 are the most self-medicated in 48.62%; The antibiotics most commonly used in self-medication are beta-lactams (51.9%), amoxicillin was the most common; 66.5% used it less than 5 days; The mode of access to antibiotics was by direct request of the user by 44.94% and by recommendation of the Pharmaceutical by 37.9%; The main route of administration of self-medication was the oral route in 95.6%. Respiratory symptoms were the most common cause of self-medication; the most common non-health reasons for self-medication were prolonged waiting time for care, treatments were already known, and antibiotics were available at home.

Conclusions: 39.9% of users of an outpatient clinic at Hospital II - EsSalud - Pucallpa practice self-medication with antibiotics; There is relationship between those with higher education and self-medication; Respiratory infections are probably the most common cause; however, other causes such as "prolonged waiting time", "known therapy", "had antibiotics at home" as possible causes of self-medication are described. The groups of

antibiotics were the beta-lactams; the main mode of access to antibiotics was by direct request of the user.

The main mode of access to antibiotics was by direct request of the user; the main route of administration was Oral, the time of use in its greater percentage was less than 5 days.

KEY WORDS: Self-medication, Antibiotic, User.