UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

TESIS

"CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA HEMORRAGIA **POST PARTO EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA DURANTE EL PERIODO ENERO-** DICIEMBRE 2012"

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

PRESENTADO POR LOS BACHILLERES:

JANDER BARDALES ARÉVALO

PAUL FRANZ SOLIS LANDEO

PUCALLPA MARZO DEL 2016

ESTA TESIS FUE APROBADA POR LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI:

Dr. Arturo Rafael Heredia
Presidente

M.C. Mg. Antonio Alberto Peña Torres
Miembro

M.C. Américo Gabriel Vergara Velarde
Miembro

M.C. Kelly María Zevallos Espinoza
Asesor

Bach. Paul Franz Solis Landeo
Tesista

Bach. Jander Bardales Arévalo
Tesista

PORTADA

1.1 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN

"CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE LA HEMORRAGIA POST PARTO EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2012".

1.2 ÁREA DE INVESTIGACIÓN

CIENCIAS CLÍNICAS

1.3 AUTORES

JANDER BARDALES ARÉVALO

Bachiller en Medicina Humana de la Universidad Nacional de Ucayali.

PAUL FRANZ SOLIS LANDEO

Bachiller en Medicina Humana de la Universidad Nacional de Ucayali.

1.4 ASESOR

M.C. KELLY MARIA ZEVALLOS ESPINOSA.

Médico Ginecóloga del Hospital Regional de Pucallpa.

Médico Ginecóloga del Instituto Materno Perinatal.

1.5 INSTITUCIONES Y PERSONAS COLABORADORAS

Hospital Regional de Pucallpa.

Universidad Nacional de Ucayali.

RESUMEN

CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE LA HEMORRAGIA POST PARTO EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA DURANTE EL PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2012.

Introducción: La Hemorragia post-parto es la complicación más importante en del tercer periodo de parto en el Perú en el año 2010 las causas directas de muertes maternas, registradas por la Dirección General de Epidemiologia del MINSA, fueron principalmente la hemorragia en 49%, en la Región de Ucayali 34 mujeres presentaron diagnóstico de Hemorragia Post Parto. **Objetivo:** Definir las características clínicas de la hemorragia postparto en pacientes atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo enero- diciembre 2012. **Método:** Según la intervención esta investigación es no experimental. De acuerdo al número de variables es descriptiva ya que pretenden decir cómo es la realidad. Según número de ocasiones que se mide las variables, la investigación fue de tipo transversal. **Resultado:** las características clínicas obstétricos que se presentaron en el estudio, el mayor porcentaje pertenece al periodo intergenésico (PI) no adecuado y al control prenatal insuficiente (sin control/atendidas) con un 21,4% de los casos cada uno respectivamente. Seguido de la patología preeclampsia – eclampsia con 11,2% de los casos, en tercer lugar la anemia con 7,1%, figuran entre los tres primero lugares. **Conclusiones:** Respecto a las características clínicas relacionados a la hemorragia post parto encontrando que el periodo intergenésico no adecuado y control prenatal (sin control y atendidas), con 21 casos ambos, en segundo lugar preeclampsia-eclampsia con 11 casos, con 7 casos anemia, 6 casos de parto precipitado, 5 casos de trabajo de parto inducido, 5 casos de gran multiparidad y 5 casos de parto prolongado; con 4 casos antecedentes de

cirugía pélvico uterina (legrado), siendo menos frecuente el desprendimiento prematuro de placenta, embarazo múltiple con 3 casos cada uno antecedentes de hemorragia postparto y polihidramnios con 2 casos cada uno y con solo 1 caso tenemos a placenta previa.

ABSTRACT

CLINICAL FEATURES OF THE POST-PARTUM HAEMORRHAGE IN PATIENTS TREATED BY THE OB-GYN SERVICE OF PUCALLPA REGIONAL HOSPITAL DURING THE PERIOD JANUARY-DECEMBER 2012.

Introduction: The post-partum haemorrhage is the most significant complication at the third term of the labour in Perú in 2010, the direct causes of maternal deaths recorded by General Directorate of Epidemiology of MINSA, were primarily haemorrhage 49%, in the region of Ucayali 34 women were diagnosed with post-partum haemorrhage **Objective**: To define clinical features of the post-partum haemorrhage in patients treated by the Ob-Gyn Service of Pucallpa regional hospital during the period January-December 2012.**Method**: According to intervention this is a non-experimental investigation. According to the number of variables, it is a descriptive investigation since it is intended to say how the truth is. According to the number of instances when variables are measured, the investigation was transversal. **Result**: The clinical and obstetric features, which were presented in this investigation, the largest percentage belongs to inappropiate intergenesic period and the inadequate perinatal care (without control/treated) with 21,4% of the cases each, respectively. Followed by preeclampsia – eclampsia with 11,2% of the cases and the third place we have anaemia with 7,1% among the top three places. **Conclusions:** Regarding the clinical features associate with post-partum haemorrhage finding that inappropiate intergenesic period and the inadequate perinatal care (without control and treated) with both 21 cases, in the second place preeclampsia- eclampsia with 11 cases, with 7 cases of anaemia, 6 cases of precipitous labour, 5 cases induced labour, 5 cases of multiparous and 5 cases of prolonged labour; with 4 cases with a history of uterine pelvic surgery (curettage), being less frequent the placental abruption, multiple pregnacy with 3 cases each one

with a history of post-partum haemorrhage and polyhydramnios with 2 cases each one and with just one case we have placenta previa.

INTRODUCCIÓN

La Hemorragia post-parto es la complicación más importante del tercer periodo de parto, de todas las muertes maternas que se producen al año en el mundo (aproximadamente 515 000 anuales), casi 30% de ellas es debido a la presencia de esta grave complicación y se calcula que a nivel global se produce una muerte materna cada 4 minutos, por esta patología. (1)

La Organización Mundial de la Salud ha calculado que 99% de todas las muertes maternas se producen en los países 'en desarrollo' y en los cuales la hemorragia posparto representa una complicación severa que con frecuencia produce este fatal desenlace. (1)

En el Perú en el año 2010 las causas directas de muertes maternas, registradas por la Dirección General de Epidemiologia del MINSA, fueron principalmente la hemorragia en 49%; la hipertensión inducida por el embarazo (HIE) en 16% y el aborto en 7%. Además, la tasa de mortalidad materna es 93/100 000 nacidos vivos, según ENDES 2011. En esta encuesta, la hemorragia sigue siendo la primera causa morbimortalidad materna. (2)

En la Región de Ucayali, según el Informe Mensual de la Producción de Servicios de Programas de Salud Materno Perinatal, DIRESA - UCAYALI, informó que se registraron 3284 número de partos durante el periodo de Enero – Diciembre 2012, de las cuales 34 mujeres presentaron

diagnóstico de Hemorragia Post Parto. El presente trabajo trata de hallar las características clínicas en el hospital regional de Ucayali. (3)