UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
15/02/01
BIBLIOTECA

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

## FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS



# "USO DE DIFERENTES NIVELES DE AFRECHO DE CAMARON (Macrobrachium amazonicum. Heller) EN LA ALIMENTACION DE PORCINOS EN CRECIMIENTO"

**TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE:**

## INGENIERO AGRONOMO

**RUBEN CASAS REATEGUI**

**PROMOCION 1,997 "ING. FREDY MARCHAND MERA"**

**PUCALLPA - PERU**
**REGIÓN UCAYALI**
**2,000**

T 4469

# I.- INTRODUCCION.

La ganadería porcina constituye una actividad de notable importancia en la región Ucayali, ocupando el segundo lugar en población con un total de 24,529 cabezas después de la ganadería bovina (Censo Agropecuario 1,994).

Sin embargo la rentabilidad de su producción se ve limitada debido principalmente a la falta de disponibilidad, costo elevado y competencia de los insumos tradicionales con el consumo humano, teniendo en cuenta que la alimentación constituye uno de los factores de mayor importancia ya que representa aproximadamente entre el 70 al 80% del costo total de producción Muñoz (1990), es necesario la búsqueda de nuevas fuentes alimenticias que adecuadamente suministradas puedan reducir los costos de las raciones en las que se incluye subproductos de la región como fuentes alternantes de proteína en sustitución a la harina de pescado cuyo costo son elevados en nuestra zona.

En la actualidad como subproducto del procesamiento para el secado del camarón de río, se genera residuo que no es aprovechado y se desperdicia en gran cantidad pudiendo ser usado en niveles adecuados en la alimentación de cerdos como fuente de proteína a bajo costo.

Por lo antes expuesto, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Evaluar el efecto bio-económico de diferentes niveles de afrecho de camarón en la alimentación de cerdos en crecimiento.