UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Académica Profesional de Enfermería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
BIBLIOTECA CENTRAL
RECIBIDO
AGO. 15 1995
Hora
Nº
Firma



UNIVERSIDAD NACIONAL
BIBLIOTECA
DE UCAYALI

"Factores de riesgo y presencia de Cáncer de Cérvix en mujeres en edad fértil que acuden al programa de Citología del Hospital Regional de Pucallpa - 1993."

12374

Tesis para Optar el Título de
Licenciada en Enfermería

Bach. Dinelda Díaz Paredes
Bach. Adela Pinedo Vásquez

PUCALLPA – PERU
REGION UCAYALI
1994

ESTA TESIS FUE APROBADA POR EL JURADO DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

Blgo. Emilio Pascual Valentin
Presidente

Méd. Orison Lovaas Bartra
Secretario

Lic.Enf. Yolanda Santos V.
Miembro

Enf-Obs.Isabel Esteban R.
Asesora

Bach.Enf.Dinelda Diaz Paredes

Bach.Enf.Adela Pinedo Vasquez

A mis padres: Luis y Acela

A mi esposo: Jesús Manuel,

por su apoyo incondicional

en la formación de mi

profesión.

Dinelda

A mis queridos padres

Eugenio y Gledis por

su constante apoyo y

dedicación en mi formación

profesional.

Adela

AGRADECIMIENTO

A la señorita Enfermera Isabel Esteban Robladillo, asesora del presente trabajo de investigación.

A nuestros profesores de la Facultad Ciencias de la Salud por habernos formado en esta útil profesión.

A nuestros amigos y compañeros de trabajo quienes con su apoyo moral nos alentaron a culminar nuestra tesis.

Finalmente a todas las personas que de una u otra manera han hecho posible la culminación de este trabajo.

CONTENIDO

Pág.

DEDICATORIA ii

AGRADECIMIENTO iii

LISTA DE CUADROS iv

INTRODUCCION

CAPITULO I

REVISION BIBLIOGRAFICA Y MARCO TEORICO 06

A. Revisión bibliográfica 06

B. Marco teórico 18

1. Consideraciones generales del Cáncer del Cuello Uterino 18

2. Consideraciones epidemiológica 20

3. Fisiopatología del Cáncer 23

3.1.- Cáncer de cervix 23

3.2.- Patología 25

3.3.- Diagnóstico 26

3.4.- Tratamiento 29

4. Factores de riesgo 34

5. Normas para el control de Cáncer de Cuello Uterino 38

5.1.- Administrativas 38

5.2.- Técnicas 41

5.3.- Educativas 42

C. Definición de términos operacionales 43

CAPITULO II

DISEÑO METODOLOGICO 47

CAPITULO III

PRESENTACION DE RESULTADOS 51

(Ver lista de cuadros)

DISCUSION

CONCLUSION

RECOMENDACIONES

RESUMEN

ANEXO

RESUMEN

El presente estudio se realizó con el propósito de identificar los factores de riesgo que en nuestra zona conlleva a las mujeres en edad fértil a tener cáncer de cuello uterino; así mismo determinar la presencia de cáncer de cervix.

Se utilizó el método descriptivo, prespectivo y longitudinal. La población estuvo constituida por 511 mujeres en edad fértil (15 a 45 años) que asistieron al programa de Citología del Hospital Regional de Pucallpa, desde el 14 de junio hasta el 30 de setiembre de 1993.

Se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento un cuestionario elaborado para el presente estudio.

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó el método descriptivo. La prueba estadística CHI CUADRADO.

Los resultados obtenidos, demuestran que los factores de riesgo más saltantes del cáncer del cuello uterino en las mujeres de edad fértil son: Gran multiparidad, edad, bajo grado de instrucción, inicio de relaciones sexuales a temprana edad y los resultados de menor trascendencia fueron: El uso de drogas (alcohol y tabaco), el aborto, el uso de métodos anticonceptivos hormonales (oral), multiplicidad de parejas sexuales.

La presencia de cáncer de cervix: encontrado en el estudio es del 2% (9 casos). El 98% se registraron como casos negativos.

Las conclusiones a los que se llegaron al término del estudio son:

- El 45 % de mujeres en edad fértil son jóvenes y poseen alto grado de instrucción.
- El 73 % de mujeres en edad fértil no usan métodos anticonceptivos hormonales y el 15 % lo usa pero por corto tiempo.
- El 59 % de mujeres son gran multíparas, siendo un factor de riesgo a contraer cáncer de cérvix.
- El 76 % de mujeres practican buenos hábitos de higiene vaginal y no padecen de infecciones vaginal cervical.

- El 62 % de mujeres en edad fértil inician a temprana edad sus relaciones sexuales.
- El 83% de mujeres tuvieron una pareja sexual.
- El 93 % de mujeres no consumen drogas.
- El 2 % de mujeres tuvieron más de un aborto y presentaron cáncer de cuello uterino.