UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL
04/04/17
OFICINA EJECUTIVA DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

"FACTORES RELACIONADOS AL TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN PROLONGADO POR BRONQUIOLITIS EN MENORES DE 6 MESES EN EL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA EN EL PERÍODO 2014-2016".

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

PRESENTADO POR LA BACHILLER:

SORIA GUEVARA LULIANA

PUCALLPA – PERÚ

2017

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores relacionados al tiempo de hospitalización prolongado por bronquiolitis en menores de 6 meses en el Hospital Amazónico de Yarinacocha en el período 2014 -2016.

Materiales y métodos: El método que se empleó para este estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo, transversal, observacional y diseño epidemiológico correlacional. Para el desarrollo de la investigación se utilizó una ficha de recolección de datos que se obtuvo de las historias clínicas de cada paciente. La ficha de recolección de datos tuvo como objetivo identificar los factores relacionados al tiempo de hospitalización prolongado por bronquiolitis, dicha ficha constó de 12 items, los cuales estaban enmarcados a recolectar información sobre los padres, el niño y la evolución de la enfermedad durante su estancia hospitalaria.

Conclusión: los factores que están relacionados al tiempo de hospitalización prolongada son: el grado de instrucción de los padres y el uso de broncodilatadores en el tratamiento por bronquiolitis; mientras que la edad, la lactancia materna, el género, la edad gestacional, el peso al nacimiento, el peso actual, la talla actual, tratamiento con soluciones hipertonica, tratamiento con cortiodes; no están relacionados al tiempo de hospitalización prolongada.

Palabras clave: tiempo de hospitalización, grado de instrucción, edad, lactancia materna, género, edad gestacional, peso al nacimiento, peso actual, talla actual, tratamiento con soluciones hipertónicas, tratamiento con corticoides, tratamiento con broncodilatadores.

ABSTRACT

Objective: To determine factors related to the extended length of hospitalization by bronchiolitis in children under 6 months at the Amazon Hospital of Yarinacocha in the period 2014-2016.

Materials and methods: The method used for this study is descriptive, retrospective, cross-sectional, observational and correlational epidemiological design. For the development of the research was used a data collection sheet that was obtained from each patient's clinical history. The purpose of the data collection form was to identify the factors related to the length of hospitalization due to bronchiolitis, this record (consisted of 12 items), which were framed to collect information about the father, the child and the evolution of the disease during the hospital stay.

Conclusión: The factors that are related to extended length of hospitalization are: educational level of parents and the use of bronchodilators in the treatment for bronchiolitis; while age, breastfeeding, gender, gestational age, birth weight, current weight, current size, treatment with hypertonic solutions, corticosteroid treatment are not related to extended length of hospitalization.

Keywords. Length of hospitalization, educational level, age, breastfeeding, gender, gestational age, birth weight, current weight, current treatment, hypertonic solutions, corticosteroid treatment, bronchodilator treatment.