UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ABANDONO DEL TRATAMIENTO PARA TB MDR EN PACIENTES QUE ACUDEN AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL II ESSALUD, PUCALLPA - UCAYALI 2013 - 2017.

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

PRESENTADO POR LA BACHILLER:

HELLEN PRISCILA LEVEAU FUCHS

PUCALLPA, MARZO DEL 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESTA TESIS FUE APROBADA POR EL JURADO EVALUADOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI:

.....

M.C. LUIS GABRIEL QUINTANA VERÁSTEGUI
Presidente

.....

M.C. LUIS ALBERTO VICENTE YAYA
Miembro

.....

Dr. ARTURO RAFAEL HEREDIA
Miembro

.....

M.C. JOSEFA LOPEZ CARDENAS
Asesora

.....

Bach. HELLEN PRISCILA LEVEAU FUCHS
Tesista

PORTADA

1.1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

"Factores que influyen en el abandono del tratamiento para TB MDR en pacientes que acuden al programa de tuberculosis en el Hospital II EsSalud, Pucallpa – Ucayali 2013 – 2017".

1.2. ÁREA DE LA INVESTIGACIÓN:

Salud Pública.

1.3. AUTORA:

Hellen Prisicla Leveau Fuchs

Bachiller en Medicina de la Facultad de Medicina Humana - UNU.

1.4. ASESORA:

M.C. Josefa López Cárdenas

Docente de la Facultad de Medina Humana - UNU.

1.5. INSTITUCIONES Y PERSONAS COLABORADORAS:

Hospital II EsSalud – Pucallpa.

DEDICADO A:

Mis padres, por su amor, trabajo y sacrificios en todos estos años, gracias a ellos he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy. Es un privilegio ser su hija.

AGRADEZCO A:

Mi esposo, por la ayuda que me ha brindado y por estar a mi lado en momentos difíciles. No fue sencillo culminar con éste trabajo, pero él siempre fue y es mi motor y motivo.

ÍNDICE

	Pág
PORTADA	iii
ÍNDICE	vi
RESUMEN	viii
INTRODUCCIÓN	xii
CAPÍTULO I: PROBLEMA	
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Formulación del problema	2
1.2.1. Problema principal	2
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivo específico	3
1.4. Justificación e importancia de la investigación	4
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	
2.1. Antecedentes	6
2.2. Bases teóricas	13
2.3. Hipótesis	29
2.4. Variables de estudio	29
CAPÍTULO: III METODOLOGÍA	
3.1. Ámbito de estudio	32
3.2. Tipo de investigación	32
3.3. Nivel de investigación	32
3.4. Método de investigación	32
3.5. Diseño de investigación	32

3.6. Población, muestra, muestreo 33
3.6.1. Población 33
3.6.2. Muestra 33
3.6.3. Muestreo 34
3.7. Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 34
3.7.1. Técnica 34
3.7.2. Instrumento 34
3.8. Procedimiento de Recolección de datos 34
3.9. Técnicas de procesamiento y Análisis de datos 34

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Presentación de Resultados 36
4.2. Discusión 43
Conclusiones 46
Recomendaciones 47
Referencia bibliográfica 48
Anexos 52
-Matriz de consistencia 53
-Modelo de instrumento 54

RESUMEN

Introducción: La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, señalan que cada año 8,8 millones de personas se enferman de tuberculosis en todo el mundo. En América Latina, más de 400 000 personas se enferman de tuberculosis cada año, siendo Haití el país que tiene la mayor población afectada de tuberculosis y el Perú ocupa el segundo lugar, presentando cada año aproximadamente 34 mil nuevos casos. Objetivo: Determinar los factores que influyen en el abandono del tratamiento para TB MDR en pacientes que acuden al programa de tuberculosis en el Hospital II Essalud, Pucallpa - Ucayali 2013-2017. Material y métodos: Se diseñó un estudio descriptivo, transversal, no experimental y retrospectivo, en los pacientes que abandonaron el tratamiento anti tuberculoso. Conclusiones: La edad que más frecuencia presentan los pacientes que abandonaron el tratamiento individualizado de tuberculosis son los comprendidos entre los 30 a 59 años (44.4%), entre los 15 a 29 años (38.9%), y los de 60 años a más (16.7%). El estado nutricional es de 27.8% normo peso y 72.2% bajo peso. El nivel de educación fueron primaria el 44.4%, secundaria el 38.9% y superior el 16.7%. El 50% fueron desempleados y el 50% son empleados, al momento que abandonaron el tratamiento. Los efectos colaterales por el tratamiento medicamentoso se presentaron en el 22.2%. Las enfermedades concomitantes se presentaron en el 27.8%. Los hábitos nocivos se presentaron en el 33.3%

Palabras clave: Abandono tratamiento individualizado tuberculosis

ABSTRACT

Introduction: The World Health Organization and the Pan American Health Organization point out that every year 8.8 million people become ill with tuberculosis worldwide. In Latin America, more than 400,000 people become ill with tuberculosis each year, with Haiti being the country with the largest population affected by tuberculosis and Peru being in second place, presenting approximately 34,000 new cases every year. Objective: To determine the factors that influenced the abandonment of treatment for MDR TB in patients who attend the tuberculosis program in Hospital II Essalud, Pucallpa - Ucayali 2013-2017. Material and methods: A descriptive, cross-sectional, non-experimental and retrospective study was designed for patients who abandoned anti-tuberculous treatment. Conclusions: The age that most frequently presents patients who left the individualized treatment of tuberculosis are those between 30 to 59 years old (44.4%), between 15 to 29 years old (38.9%), and those 60 years old and over (16.7%). The nutritional status is 27.8% normal weight and 72.2% low weight. The level of education was primary 44.4%, secondary 38.9% and higher 16.7%. 50% were unemployed and 50% are employed at the time they left the treatment. The side effects of the drug treatment were presented in 22.2%. Concomitant diseases occurred in 27.8%. The harmful habits were presented in 33.3%

Keywords: Leaving tuberculosis individualized treatment